



Les agresseurs biologiques et le retrait préventif des travailleuses enceintes oeuvrant en milieu scolaire

	Varicelle	Rubéole	Parvovirus B-19	Rougeole	Coqueluche	Oreillons	Scarlatine
Sérologie	Au début de la grossesse ou avant, s'il n'y a pas d'antécédents de varicelle	Au début de la grossesse ou avant	Au début de la grossesse ou avant (5 ^{ième} maladie)	En présence d'un cas	Non-indiquée	En présence d'un cas	Aucune
Réaffectation	Qu'il y ait présence de cas ou non, en attente des résultats de sérologie et si séronégative	Qu'il y ait présence de cas ou non, en attente des résultats de sérologie et si séronégative	Qu'il y ait présence de cas ou non, en attente des résultats de sérologie et si séronégative	En présence d'un cas dans l'école : en attente des résultats de sérologie et si sérologie négative	En présence d'un cas dans sa classe ou d'au moins 2 cas dans l'école	En présence d'un cas dans sa classe ou d'au moins 2 cas dans l'école	Aucun conseil : consulter le médecin traitant si fièvre ou mal de gorge
Durée de la réaffectation	Jusqu'à la fin de la grossesse	Jusqu'à la fin de la grossesse	Jusqu'à la fin de la grossesse	Jusqu'à 21 jours après le dernier cas	À partir de la 30 ^e semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement	Jusqu'à 28 jours après le dernier cas	Aucune